

Вероятный залёт исландского песочника ново-сибирского подвида *Calidris canutus piersmai* на Чукотку

П.С.Томкович, Е.Ю.Локтионов

Павел Станиславович Томкович. Научно-исследовательский Зоологический музей, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Большая Никитская ул., д. 6, Москва, 125009, Россия. E-mail: pst@zmmu.msu.ru

Егор Юрьевич Локтионов. Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, 2-я Бауманская ул., д. 5., стр. 1, Москва, 105005, Россия. E-mail: eloktionov@mail.ru

Поступила в редакцию 16 августа 2017

У исландского песочника *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758) в настоящее время различают 6 подвигов, 4 из которых распространены на гнездовании в России (Коблик и др. 2006; Buehler, Piersma 2008) и имеют при этом изолированные друг от друга участки ареала (Лаппо и др. 2012). Исландские песочники Таймыра *C. c. canutus* (Linnaeus, 1758) и Новосибирских островов *C. c. piersmai* Tomkovich, 2001 хорошо отличаются от восточных птиц с острова Врангеля *C. c. roselaari* Tomkovich, 1990 и материковой Чукотки *C. c. rogersi* Mathews, 1913 интенсивностью и распространением рыжей окраски оперения. Птицы первой группы (*C. c. canutus* и *C. c. piersmai*) обладают более насыщенным оранжево-рыжим тоном окраски верха и низа тела, как правило с интенсивно окрашенным брюхом и подхвостьем, в отличие от восточных птиц (*C. c. roselaari* и *C. c. rogersi*), окраска которых ближе к кремово-рыжей (персиковой), а брюхо и подхвостье чаще бывают белыми (Tomkovich, Riegen 2000; Tomkovich 2001; Hassell *et al.* 2011). При этом следует учитывать, что на брюхе и подхвостье самок как правило меньше окрашенных перьев, чем у самцов.

С 2009 года мы проводим индивидуальное мечение исландских песочников, размножающихся на юге Чукотки в районе села Мейныпильгыно (62°32' с.ш., 177°03' в.д.) (Tomkovich *et al.* 2013). Там обитают птицы типичной, сравнительно бледной окраски чукотского подвида (рис. 1). Весной 2017 года в районе наблюдений отмечен более интенсивный, чем в прежние годы, весенний пролёт исландских песочников северных группировок с 24 мая, по крайней мере, до 30 мая. Среди немеченых исландских песочников 31 мая встречена птица необычной для Чукотки яркой окраски с интенсивно окрашенными спиной, брюхом и подхвостьем (рис. 2), что характерно для исландских песочников западных подвигов Сибири. При этом следует обратить внимание на то, что даже для птиц этих западных подвигов особь, изображённая на

рисунке 2, окрашена предельно ярко, что может указывать на то, что это самец.



Рис. 1. Окраска исландских песочников *Calidris canutus rogersi* на материковой Чукотке (слева самец, справа самка). 31 мая 2017. Фото авторов.



Рис. 2. Исландский песочник (наиболее вероятно, подвида *Calidris canutus piersmai*), встреченный 31 мая 2017 в окрестностях села Мейнышлыгно. Чукотка. Фото авторов.

Исландские песочники Таймыра и Новосибирских островов различаются, главным образом, размерами (Tomkovich 2001), но на основании фотографии на рисунке 2 невозможно судить о популяционной принадлежности наблюдавшейся яркой птицы (её размерные характеристики неопределимы). Тем не менее известно, что таймырские исландские песочники номинативного подвида совершают сезонные перелёты через Европу в Западную Африку (например, Piersma *et al.* 1992; Buehler, Piersma 2008), а птицы с Новосибирских островов улетают зимовать через восточное побережье Азии в Австралию и Новую Зеландию совместно с чукотскими песочниками (Tomkovich, Riegen 2000; Hassell *et al.* 2011; и др.). На этом основании можно предполагать, что встреченный на Чукотке яркий исландский песочник с наибольшей вероятностью принадлежит к ново-сибирскому подвиду *Calidris canutus piersmai*. Птицы этого подвида мигрируют весной несколько позже чукотских исландских песочников (Battley *et al.* 2005; Rogers *et al.* 2010), поэтому встреча яркой особи в конце периода пролёта чукотских птиц также соответствует её принадлежности к ново-сибирскому подвиду. Данная находка предполагаемого *C. c. piersmai* – первая для Чукотки.

Наблюдения выполнены в ходе международной экспедиции Русского общества сохранения и изучения птиц на Чукотку под руководством Е.Е.Сыроечковского. Подготовка публикации осуществлена П.С.Томковичем в рамках гос. темы Зоологического музея МГУ АААА-А16-116021660077-3. Благодарим Е.А.Коблика за ценную консультацию в отношении названий цветовых оттенков оперения птиц.

Л и т е р а т у р а

- Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1-256.
- Лаппо Е.Г., Томкович П.С., Сыроечковский Е.Е. 2012. *Атлас ареалов гнездящихся куликов Российской Арктики*. М.: 1-448.
- Battley P.F., Rogers D.I., van Gils J.A., Piersma T., Hassell C.J., Boyle A., Yang H.Y. 2005. How do Red Knots *Calidris canutus* leave northwest Australia in May and reach the breeding grounds in June? Predictions of stopover times, fuelling rates and prey quality in the Yellow Sea // *J. Avian Biol.* **36**: 494-500.
- Buehler D.M., Piersma T. 2008. Travelling on a budget: predictions and ecological evidence for bottlenecks in the annual cycle of long-distance migrants // *Phil. Trans. R. Soc. B* **363**: 247-266.
- Hassel C., Southey I., Boyle A., Yang H.-Y. 2011. Red Knot *Calidris canutus*: subspecies and migration in the East Asian-Australasian flyway – where do all the Red Knot go? // *BirdingASIA* **16**: 89-93.
- Piersma T., Prokosch P., Bredin D. 1992. The migration system of Afro-Siberian Knots *Calidris canutus canutus* // *Wader Study Group Bull.* **64**, Suppl.: 52-63.
- Rogers D.I., Yang H.-Y., Hassell C.J., Boyle A.N., Rogers K.G., Chen B., Zhang Z.-W., Piersma T. 2010. Red Knots (*Calidris canutus piersmai* and *C. c. rogersi*) depend on a small threatened staging area in Bohai Bay, China // *Emu* **110**: 307-315.
- Tomkovich P.S. 2001. A new subspecies of Red Knot *Calidris canutus* from the New Siberian Islands // *Bull. Brit. Ornithol. Club* **121**, 4: 257-263.

- Tomkovich P.S., Riegen A.C. 2000. Mixing of Red Knot populations in Australasia: some thoughts // *Stilt* **37**: 25-27.
- Tomkovich P.S., Porter R.R., Loktionov E.Y., Niles L.J. 2013. Pathways and staging areas of Red Knots *Calidris canutus rogersi* breeding in southern Chukotka, Far Eastern Russia // *Wader Study Group Bull.* **120**: 181-193.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1487: 3436-3442

Материалы к распространению редких видов птиц в Орловской области

В.С.Сарычев

Владимир Семёнович Сарычев. Воронежский государственный университет, заповедник «Галичья гора», п/о Донское, Задонский район, Липецкая область, 399240, Россия. E-mail: vssar@yandex.ru

Поступила в редакцию 10 августа 2017

В данном сообщении приведены сведения о встречах некоторых редких видов птиц, полученные в результате обследования восточных районов Орловской области. В частности, 20 августа 1983, 17 июня 1993 и 21-22 мая 2014 наблюдения были проведены в урочище Кузилинка и его окрестностях на левобережье реки Олым у села Навесное (Ливенский район). В долине реки Кшень сбор материала проводился 17 июня 1993 у села Екатериновка (Ливенский район) и 22-23 мая 2014 близ села Рогатик (Должанский район). В пределах Шатиловского лесничества (окрестности сёл Моховое и Шатилово, Новодеревеньковский район) работы велись 2-4 июля 2005 (совместно с С.Ф.Сапельниковым) и 12-13 июня 2015 (совместно с И.С.Климовым и М.М.Тикуновой). В 2012 году с 3 по 5 мая обследовались (совместно с В.П.Иванчевым) река Сосна и некоторые её притоки (Тим, Труды, Любовша, Фошня, Кшень и др.) в Ливенском, Должанском, Колпнянском, Малоархангельском, Покровском и Верховском районах. В 2017 году наблюдения проведены с 29 апреля по 1 мая (совместно с М.М.Тикуновой) и с 5 по 7 июля (совместно с С.В.Недосекиным и М.М.Тикуновой) в Ливенском, Должанском, Колпнянском, Малоархангельском и Покровском районах. Исследования в 2015 и 2017 годах выполнены в рамках проекта по сбору данных для Атласа гнездящихся птиц Европейской России. Материалы, полученные в 2005 и 2015 годах, опубликованы ранее (Сарычев, Сапельников 2007; Сарычев, Климов, Тикунова 2016). Большинство указанных ниже мест находок рассматриваемых видов птиц ранее не были известны и в литературе (Красная книга... 2007; Вышегородских 2012; Недосекин 2013; и др.).