снижаются. Увеличение содержания олова до 20000 ppm сильно снижает скорость реакции и конечное давление, что может говорить об ингибировании контактной массы в присутствии большого количества Sn, что отмечается для работ по хлорному синтезу [4]. Дополнительные опыты с другими источниками олова, взятым в эквивалентных (по содержанию Sn) количествах подтвердили, что эффект активации связан именно с действием олова в его активных формах, а не хлора в составе SnCl₂.

Ряд дополнительных экспериментов и исследования контактных масс методами РФА, РФЭС и СЭМ и позволили установить, что механизм действия добавки олова заключается в ускорении стадии восстановления Cu²⁺ в CuO до каталитически активной Cu⁰.

Также следует отметить аномально высокую толерантность механохимического реактора высокого давления к большим нагрузкам олова и других добавок, что не характерно для других способов проведения реакции. Это обстоятельство делает механохимический подход удобным для глубокого изучения особенностей протекания реакции в присутствии различных промоторов.

Таким образом, использование оксида меди (II) с добавкой олова позволяет достигать скоростей реакции, сопоставимых со скоростью процесса с CuCl, который является одним из самых активных катализаторов данного процесса.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФ № 18-73-10153.

Литература

1. *Temnikov M. N.* [et al.] Direct synthesis of alkoxyxilanes: current state, challenges and prospects // Russ. Chem. Rev. 2023. V. 92(7): RCR5081.
2. *Temnikov M., Zhemchugov P.* [et al.] Mechanochemistry — a new powerful green approach to direct synthesis of alkoxyxilanes // Green Chem. 2018. V. 20(9). P. 1962–1969.
3. *Krizhanovskiy, I.N. Temnikov M.N.* [et al.] Direct synthesis of tetraalkoxyxilanes in a high-pressure mechanochemical reactor // React. Chem. Eng., 2022. V. 7(3). P. 769–780.
4. *Pakula D., Marciniak B., Przekop R.* direct synthesis of silicon compounds—from the beginning to green chemistry revolution // AppliedChem, 2023. V. 3(1). P. 89–109.

УДК 544.72

Использование олигосахаридов в качестве узнающих элементов биосенсоров на основе ОПТЭЗ

П. Н. Караман, Е. Ю. Пойманова, В. Б. Крылов, Е. В. Агина

Институт синтетических полимерных материалов Н. С. Ениколопова РАН

В мире постоянно возрастает спрос на новые биологические и химические сенсоры, так как такие устройства позволяют проводить идентификацию биологических объектов и химических соединений. Органические электролитические транзисторы (ОЭТ) являются перспективной платформой для сверхчувствительного, быстрого и надежного обнаружения биологических молекул для недорогих биоэлектронных датчиков в местах оказания медицинской помощи [1]. Преимущество по сравнению с другими технологиями обнаружения, такими как электрохимические или оптические, заключается в способности давать ответ без меток с использованием простой электронной схемы считывания, которую можно легко миниатюризировать и удешевить, также используя, например, технологии печатных схем и гибкие материалы подложек [2]. С помощью биосенсоров на основе ОЭТ можно детектировать очень низкие концентрации аналитов, что в медицине позволяет определять биомаркеры заболеваний на ранних стадиях. Одним из таких заболеваний является аспергиллез — грибковое заболевание человека, животных и птиц, вызываемое аспергиллами — плесневыми грибами рода *Aspergillus*, выявление которого на ранних стадиях особенно критично для групп риска и для исключения рецидивов заболевания. На данный момент стандартом для определения плесневых грибов является тестом на основе лизата амебоцитов *Limulus* (LAL), недостатком которого является большое количество ложноположительных результатов.

Данная работа направлена на изучение отклика биорецепторного слоя в ОЭТ-биосенсоре на биотинилированные олигосахариды, родственные галактоманнану или β-(1→3)-D-глюкану, входящие в состав клеточной стенки гриба *Aspergillus*, с помощью моноклональных антител 7B8 или 5H5 в качестве платформы для экспресс-тестирования грибкового заболевания человека аспергиллеза [3]. Исследовано распределение мест связывания аналитов на поверхности ОЭТ-биосенсора на основе малых молекул, подтверждающие создание крупномасштабного биораспознающего слоя, реализующегося за счет

биотинстрептавидинового взаимодействия. Продемонстрирован специфический отклик ОЭТбиосенсора на полисахариды бета-глюкан и галактоманнан посредством моноклональных антител (5H5, 7B8). Показана селективность устройства. Обнаруженные с помощью биосенсора количества полисахаридов сопоставимы с результатами, получаемыми иммуноферментным анализом на основе антител, и конкурировать с тестом LAL.

Работа выполнена при поддержке проекта Госзадания № FFSM-2022-0001

Рис. 1. Схема специфических и неспецифических связываний олигосахаридов с моноклональными антителами

Литература

1. *Shaposhnik P. A.* [et al.]. Modern bio and chemical sensors and neuromorphic devices based on organic semiconductors // Russian Chemical Reviews. 2020. V. 89. P. 1483–1506.
2. *Пойманова Е. Ю., Шапошник П. А., Караман П. Н.* Органические электролитические транзисторы на основе 2,6-диоктилтетрахиеноацена как удобная платформа для создания жидкостных биосенсоров // Известия академии наук. Серия химическая. 2022. С. 2116–2122.
3. *Poimanova E. Yu.* [et al.]. Biorecognition Layer Based On Biotin-Containing [1]Benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene Derivative for Biosensing by Electrolyte-Gated Organic Field-Effect Transistors // ACS Applied Materials & Interfaces. 2022. V. 14. P. 16462–16476.